

eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces pour combattre les problèmes de peau péristomiale.

4 raisons de l'utiliser:

1. Choisir l'appareillage idéal est une part importante de la guérison post-opératoire.¹
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port sûre et prévisible.²
3. L'irritation péristomiale est une complication courante lors de la prise en charge d'une stomie.
4. Les problèmes de peau péristomiale peuvent être éliminés avec un appareillage adapté.^{3,4}

Etude de cas transmise par :
Bataa El-Erakey, infirmière stomathérapeute, Australie.

Références :

1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2016) Peristomal skin complications: Best practice for clinicians. 4. Hooper J (2018) Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute www.woundcentral.com

*Skinsmart: respectueux de la peau

Historique du patient:

- Mr PF a subi un cancer rectal
- Recto-colectomie
- Sorti de l'hôpital avec une poche 1-pièce convexe vidable

Problèmes:

- Transit intestinal alternant entre des selles liquides et solides
- Difficile de vider la poche lorsque les selles sont solides
- Doit changer de poche très souvent lorsque les selles sont liquides
- A subi des fuites
- A développé une excoriation cutanée péristomiale



Analyse de l'infirmière:

- Excoriation de la peau péristomiale
- Sensation désagréable pour le patient
- Fuites dues à des selles imprévisibles
- Difficultés à placer correctement l'appareillage 1-pièce

L'infirmière a recommandé eakin dot® 2-pièces:

- Possibilité d'alterner les poches pour pallier aux changements des selles
- Hydrocolloïde *skinsmart** rallonge la durée de port
- La facilité de placement du support réduit les problèmes cutanés péristomiaux et prévient les fuites

Résultats:

- La peau péristomiale va mieux
- Pas de fuites
- Facile d'utilisation
- Capable d'alterner entre des poches fermées ou vidables en fonction des selles

Preuves cliniques des avantages d'eakin dot® 2-pièces :

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde *skinsmart** rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces pour le traitement d'une hernie parastomiale

4 raisons de l'utiliser:

1. Choisir l'appareillage idéal est une part importante de la guérison post-opératoire.¹
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port fiable et prévisible.²
3. Les hernies parastomiales sont une complication courante selon les stomathérapeutes.³ Elles apparaissent dans 25 à 50% des cas.⁴
4. La guérison post-opératoire n'est pas toujours simple. Certains patients nécessitent un changement de produits à cause de douleurs post-opératoires et la gestion des plaies.

Etude de cas remise par :

Felicity Rackham / Liz Meakin, infirmières stomathérapeutes, Epworth Eastern Hospital, Australie

Références :

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Burch J. 2018 Nursing strategies for the prevention and management of parastomal hernias. Gastrointestinal Nursing 16(2) 38-42 4. Thompson MJ, Trainor B (2005) Incidence of parastomal hernia before and after a prevention programme 3(2):23-27

*Skinsmart: respectueux de la peau

Historique du patient:

- Une hernie est apparue chez Mme A - femme de 73 ans - suite à une colostomie
- Après une opération chirurgicale, cette dame souhaitait reprendre son ancien appareillage 2-pièces convexe qu'elle trouvait confortable et dont elle avait l'habitude de se servir

Problèmes:

- Douleur récurrente sur le côté gauche de la stomie, indiquant que le placement du support convexe faisait pression autour de la stomie
- Des fuites dues à la surface non plane autour de la stomie



Analyse de l'infirmière:

- Peau abimée autour de la stomie
- Des bleus légers et une peau fragile sur le côté droit du support.
- Des signes de lésions dûs au retrait de l'adhésif au niveau des extrémités du support à cause des fréquents changements

L'infirmière a recommandé eakin dot® 2-pièces:

- Moins de douleur et de bleus sur le côté latéral de l'appareil
- Mme A se sent à l'aise pour s'occuper seule de son appareillage chez elle

Résultats:

- 2 semaines après avoir commencé à utiliser eakin dot® 2-pièces en plus d'un anneau protecteur sous le support, l'état de la peau de Mme A s'était considérablement amélioré
- La peau a continué sa guérison lors des semaines suivantes

Preuves cliniques des avantages d'eakin dot® 2-pièces:

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde *skinsmart*™ rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces: Le point de vue d'un proche prenant soin d'un patient

4 raisons de l'utiliser:

1. Choisir l'appareillage idéal est une part importante de la guérison post-opératoire.¹
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port prévisible et fiable.²
3. Lorsque l'autonomie est impossible, les soins liés à la stomie peuvent être effectués par un proche ou un professionnel. Beaucoup de proches craignent de retirer l'appareillage, de peur d'abimer la peau.³
4. eakin dot® 2-pièces répond aux besoins des patients et de leurs soignants.

Etude de cas remise par:

Kate Slattery,
Nurse Advisor,
TG Eakin Irlande

Références :

1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Black P (2011) The role of the carer and patient in stoma care. Nursing and Residential Care 13(9) 432-436

*Skinsmart: respectueux de la peau

Historique du patient:

- Homme de 80 ans, marié
- Un cancer de l'intestin a été diagnostiqué à Mr S
- Résection de l'intestin antérieur et création d'une iléostomie
- Complications post opératoires ayant retardé la guérison et la sortie de l'hôpital un mois après l'opération
- Mr S est autonome lorsqu'il vide sa poche, mais a besoin de l'assistance de sa femme lors des changements de poche



Analyse de l'infirmière:

- Mr S utilisait une poche avec un support convexe, sans anneau
- L'infirmière avait conseillé à Mr S et sa femme de changer d'appareillage tous les 2 à 3 jours, mais bien souvent le changement était opéré seulement tous les 5 jours
- Présence de fuites et d'irritations

L'infirmière a recommandé eakin dot® 2-pièces:

- Essai de l'appareillage avec un anneau eakin Cohesive SLIMS®
- En deux semaines, la peau était presque totalement réparée
- Pas de fuites
- Mr S et sa femme changent le support tous les 4-5 jours et la poche tous les jours

Résultats:

- Une fois familiarisée avec le système à CLIC audible, Mme S était à l'aise et confiante pour coupler l'appareillage seule
- Ils sont très contents du fonctionnement de l'appareillage et trouvent qu'il leur donne un sentiment de sécurité, de confort et de facilité

Preuves cliniques des bénéfices d'eakin dot® 2-pièces:

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde skinsmart™* rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces pour gérer les désagréments à long terme liés à une stomie.

4 Raisons de l'utiliser :

1. Choisir l'appareillage idéal est une part importante de la guérison post-opératoire.¹
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port sûre et prévisible.²
3. Les désagréments sur le long terme peuvent avoir une influence majeure sur la capacité d'une personne à vivre normalement.³
4. Il faudra prendre en compte certaines considérations et restrictions lors du choix d'un produit approprié, afin d'encourager l'autonomie de la personne stomisée.³


*Skinsmart: respectueux de la peau

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE

Historique du patient:

- Homme de 75 ans vivant seul et dont la mobilité est limitée
- A subi un cancer rectal
- Résection pour créer une colostomie
- Antécédents de maladies chroniques, incluant la maladie de Parkinson, des troubles bipolaires, de l'hypertension, de la sténose aortique et de l'arthrose



L'infirmière a recommandé eakin dot® 2-pièces:

- Après que l'infirmière stomathérapeute ait déterminé les capacités du patient, elle a recommandé eakin dot® 2-pièces en post-opératoire
- Revu 3 semaines après l'opération

Retours de l'infirmière:

- Aucune fuite avec l'appareillage eakin dot® 2-pièces
- Cela lui a grandement permis d'améliorer sa confiance en lui
- La peau péristomiale est saine
- Il est autonome et peut changer lui-même son appareillage
- Changement du support tous les 3-4 jours
- Il dit adorer sa poche et en particulier la facilité de couplage grâce au CLIC audible lors de la mise en place de la poche



Résultats:

- Il est autonome, aucun problème ou fuite
- La stomie est belle, de 30 mm de diamètre
- La peau péristomiale est intacte
- Malgré des tremblements de plus en plus intenses dus à la maladie de Parkinson, il est capable de coupler facilement l'appareillage

Preuves cliniques des bénéfices d'eakin dot® 2-pièces:

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde *skinsmart*™ rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

Etude de cas remise par:

Kelly Vickers,
infirmière stomathérapeute,
Hôpital Lyell Mc Ewin,
Adelaïde,
Australie.

Références :

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Iley H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. *BJN* 17(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Reading L (2014) Practical guidance for nurses caring for patients with long-term conditions. *British Journal of Community Nursing* 21(2) 90-98