

Desinfektionsplan für die Spitex

Hände	Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • Baktolin sensitive • Baktolin pure 	gebrauchsfertig	Bei Bedarf.	Waschlotion aus Dosierspender. Seifenreste gründlich abspülen. Einwegtücher verwenden.
Desinfektion hygienisch	<ul style="list-style-type: none"> • Sterillium med • Sterillium Gel pure 	gebrauchsfertig 3 ml – 30 Sek.	Vor/nach allen Massnahmen am Klienten. Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material.	Konzentrat aus Dosierspender in die trockenen Hände einreiben. Während der gesamten Applikationszeit feucht halten.
Pflege	<ul style="list-style-type: none"> • Baktolan balm pure • Baktolan prectect+ pure 	gebrauchsfertig	Bei Bedarf mehrmals täglich.	Ausreichende Menge gleichmässig in die trockenen Hände einreiben.
Haut	Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
Hautdesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> • Cutasept F 	gebrauchsfertig mind. 15 Sek.	Vor Blutabnahmen und Injektionen.	Aufsprühen, mit sterilisiertem Tupfer einreiben. Nochmals aufsprühen. Vollständig abtrocknen lassen.
Instrumente	Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
Desinfektion (manuelles Verfahren)	<ul style="list-style-type: none"> • Bomix plus 	2,0% – 5 Min. 1,0% – 15 Min. 0,75% – 30 Min.	Nach der Vorreinigung.	Desinfektionsgut in Einzelteile zerlegen oder geöffnet blasenfrei in die Desinfektionslösung einlegen. Hohlräume füllen, Kanäle mit Spritze durchspülen. Nach der Desinfektion alle Teile mit Wasser gründlich ab- und durchspülen und trocknen. Standzeit 1 Tag.
Flächen und Geräte	Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
Medizinische Geräte, Blutdruckmanschetten, Stethoskope, Staubbinden, Fieberthermometer, Tablets, Arbeitsflächen	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillol 30 Sensitive Tissues 	gebrauchsfertig Schnell-desinfektion 1 Min.	Bei Bedarf.	Mit Bacillol 30 Sensitive Tissues feucht abwischen. Herstellerangaben beachten. Nicht nachtrocknen.
Abfall	Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
Kanülen, spitze Gegenstände	<ul style="list-style-type: none"> • Nadelbox • Plastikbehälter 		Sofort nach Gebrauch.	Sammeln der Einmal-Materialien in bruch- und stichfesten Kunststoffbehältern. Volle Behälter gut verschlossen in die Apotheke resp. Spezialentsorgung geben.